


Rektoskopi

Kikkertundersøgelse af
endetarmen

En rektoskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen med henblik på at afdække sygelige forandringer i denne.



Undersøgelsen er risikofri. På Aleris bliver du altid undersøgt af en speciallæge med meget stor rutine i denne slags undersøgelser. Dette giver dig en sikkerhed for, at du får en korrekt diagnose på dine symptomer, og at undersøgelsen forløber med mindst mulig ubehag.

Rektoskop

Et rektoskop er et ca. 20 cm langt, stift plastikrør med en lyskilde, som føres op i endetarmen. Man kan herved undersøge den nederste del af tarmen. Såfremt der findes unormale forhold, kan der under undersøgelsen tages vævsprøver fra slimhinden vha. en lille tang. Dette er smertefrit.

Hvornår anvender man en rektoskopi?


En rektoskopi bruges til at afdække årsagen til:

- Smerter i endetarmsåbningen
- Problemer med at holde på afføringen
- Tømningsbesvær af endetarmen

Den kan afsløre lidelser såsom:

- Hæmorider
- Polypper i endetarmen
- Fremfald af endetarmens slimhinde (prolaps)
- Betændelse i endetarmen
- Fistler
- Kræft i endetarmen

Spredning af tarmkræft



Tarmkræft udvikler sig fra en polyp, som er forstadiet til kræft (stadie 0). Stadie 1 er en tidlig kræftknude, som ubehandlet vokser videre og ender i stadie 4, hvor kræften har spredt sig til lymfeknuder og / eller andre organer såsom lever og lunger.

Forundersøgelse

En rektoskopi foretages ambulantly enten i forbindelse med eller efter en forundersøgelse.

Forberedelse

Mad og drikke

Du kan spise og drikke normalt inden undersøgelsen.

Udrensning

Endetarmen skal være helt tom for, at undersøgelsen kan gennemføres. Du skal derfor i forvejen have købt et 120 ml. Klyx på apoteket, som du skal anvende 2 timer før undersøgelsen. Følg vejledningen i pakken.

Undersøgelsen

Undersøgelsen foregår ambulantly. Undersøgelsen tager kun få minutter og gør ikke ondt, men det kan forbigående være ubehageligt.

Hvordan foregår det?

Ved undersøgelsen ligger du på ryggen med benene oppe i 2 benholdere. Rektoskopet føres af speciallægen op i endetarmen, og der kan nu pustes en smule luft ind i tarmen for, at tarmen foldes ud, så slimhinden kan ses efter.

Efter undersøgelsen

Oftest er der ingen gener efter undersøgelsen, og du kan tage hjem umiddelbart efter undersøgelsen.

Dog kan den luft, der pustes op i tarmen, spænde lidt i maven bagefter, selv om speciallægen tømmer så meget ud som muligt.

Svar på undersøgelsen

Du taler med speciallægen om resultatet af undersøgelsen, inden du tager hjem. Du modtager senere beskrivelsen af undersøgelsen, som bliver tilsendt. Hvis der er taget vævsprøver, kan der gå 8 -14 dage, før der er svar på disse.

Du aftaler med speciallægen, inden du tager hjem, hvordan du skal have svaret på prøverne, og om der er behov for yderligere opfølgning.

Mulige bivirkninger og komplikationer

Der er ingen bivirkninger eller komplikationer knyttet til undersøgelsen.

Patienttilfredshed

For at Aleris fortsat kan yde den bedste pleje, behandling og service, beder vi dig venligst udfylde vores tilfredshedsundersøgelse, som du vil modtage på mail, såfremt du har givet tilladelse hertil. Såvel positiv som negativ kritik er vigtig for os i vores bestræbelser på at yde det bedst mulige behandlingsforløb for vores patienter.

I alle afdelinger er der opstillet standere, hvor vi spørger dig, om du vil anbefale Aleris til andre. Du afgiver dit svar med blot ét tryk på den smiley du synes passer bedst.

Eventuelle klager over dit forløb på Aleris beder vi dig venligst fremsende direkte til Aleriss direktion, att. Den Virksomhedsansvarlige læge, Aleris Gyngemose Parkvej 66, 2860 Søborg.

Skulle du ikke ønske dette, kan du læse nærmere om klagemuligheder på Patientombuddets hjemmeside: www.patientombuddet.dk. Her finder du vejledning og klageskema.

Ønsker du at søge om erstatning for fejl, du mener, der er begået, retter du henvendelse til Patientforsikringen. Se vejledning og klageskema på www.patientforsikringen.dk.



Aleris Hospitaler - Vest

Aalborg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris.dk

Esbjerg

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris.dk

Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris.dk

Herning

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Øst

København

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris.dk

Ringsted

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

www.aleris.dk

Telefon åbningstider i kundeservice

	Vest	Øst
Mandag - torsdag	8 - 18	8 - 18
Fredag	8 - 15	8 - 16
Lørdag - søndag	Lukket	Lukket

KUJG02